

&lt;生薬製剤&gt;痔疾治療内服薬

第②類医薬品

# レンシン<sup>®</sup>

RENSHIN

貯法：室温保存

- ・本剤は生薬のみを配合した痔の内服薬です。
- ・痔疾の原因となる肛門周囲の血液循環障害を改善するとともに患部の炎症をおさえて痛み、出血、はれ、かゆみなどの諸症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)  
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
下痢
  - (5) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (6) 次の医薬品を服用している人。  
瀉下薬(下剤)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤
消化器	食欲不振、恶心、嘔吐、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

痔疾、痔出血

## 用法・用量

大人(15才以上)1回1包 1日2回

朝は食前、夜は就寝前 1回に1包を水またはお湯で服用して下さい。

### <用法・用量に関する注意>

(1)小児には服用させないで下さい。

(2)服用の際は、定められた用法・用量を守って下さい。

また、治療効果をより高めるために次の点にご留意下さい。

①アルコール飲料、タバコ及び強い刺激物は避けて下さい。

②患部は常に清潔に保つようにして下さい。

③足、腰、腹部の保温にご留意下さい。

④纖維質の多い植物性食品を摂取し、規則正しい便通を心がけて下さい。

## 成分及び分量

1日服用量2包中に次の成分を含んでいます。

成 分	含有量
蓮茎	1.5g
カイカ	0.7g
(日局)ショウキョウ	0.3g
(日局)センナ	0.2g

## 保管および取扱い上の注意

(1)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## その他

本剤は天然の生薬を原料としていますので、製品により多少色調が異なることがあります、効果には変わりありません。

## 包装

14包入り(7日分)、28包入り(14日分)、56包入り(28日分)

本製品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店または下記にお願いいたします。  
レンシン製薬株式会社  
電話 (0776) 67-0453  
受付時間 10:00~16:00(土・日・祭日を除く)

製造販売元



REN SHIN

レンシン製薬株式会社

福井県坂井市丸岡町友末11-14