

患部で早く溶けて、効きめを発揮
小さいサイズで挿入しやすい

エスジールAE坐剤[®]

S. ZIEL-AE SUPPOSITORIES

エスジールAE坐剤は、患部の炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、傷の治りをたすけるビタミンA、末梢血行をよくして患部のうっ血を除くビタミンEなどを配合した坐剤で、痔の痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果をあらわします。また、エスジールAE坐剤は、小さなサイズですから挿入しやすく、すみやかに溶けて、効きめを発揮します。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他 | 刺激感、化膿 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |

- (2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合。

■ 効能・効果

され痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和

■ 用法・用量

次の1回量を1日1~2回、肛門内に挿入します。

| 年齢 | 成人（15才以上） | 15才未満 |
|-----|-----------|---------|
| 1回量 | 1個 | 使用しないこと |

■ 坐剤の取り出し方と使い方



①まず1個分のコンテナを切離し、図のように上端の切り口から引き裂いて坐剤を取り出します。




②図のように入差し指を坐剤の底にあて、肛門内に挿入してください。

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。

また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。



万一、坐剤が溶けたり、軟らかくなりすぎた場合には、コンテナのまま、お湯（約45℃）に入れて溶かし、図のように坐剤の先端を下向きにして水につけ、しばらく放置すると形が整い固まります。

(3)肛門にのみ使用してください。

成分と作用

| 成 分 | 1個(1.2g) 中 | 作 用 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 5mg | 局所の炎症・はれをしめます。 |
| リドカイン | 60mg | 局所の痛み・かゆみをしめます。 |
| dL-メチルエフェドリン塩酸塩 | 10mg | 血管を収縮させ、出血をおさえます。 |
| 乾燥硫酸アルミニウムカリウム | 5.4mg | 殺菌作用により、細菌の感染を防ぎます。 |
| クロルヘキシジン塩酸塩 | 3.6mg | |
| アラントイン | 20mg | 傷の治りをたすけ、粘膜組織の修復をうながします。 |
| ビタミンA油 | 1mg (ビタミンAとして1,000I.U.) | |
| トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル) | 50mg | 肛門周囲の末梢血行をよくして、うっ血を除きます。 |


添加物として、アルギン酸Na、CMC-Na、ハードファット、ポリオキシエチレンセチルエーテル、BHTを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない30℃以下の涼しい所に坐剤の先端が下向きになるように保管してください。(溶ける温度約35℃)

▲マークについて

外箱についている▲マークは、好ましい保管状態を示しています。このように坐剤の先端が常に下向きになるように保管しておくと、万一、坐剤が溶けたり軟らかくなった場合にも、坐剤の変形を防ぎます。



○開封後、コンテナを再び外箱に入れる時には、坐剤の先端が下向きになるようにして入れてください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

日常生活では…

○肛門部にうっ血をおこしやすい状態(座る・かがむなど)は、長時間続けないようにしてください。

○痔の種類を問わず便秘や下痢をさけ、規則正しい便通をつけるようにします。

○患部はいつも清潔に保ちます。

○肛門部に充血をおこさせる熱い風呂はさけ、ぬるめの湯に毎日入浴するようつめます。

○次にあげるようなものは、とりすぎないよう気をつけます。

アルコール飲料、香辛料(ワサビ・コショウ・カラシ)、嗜好品(コーヒー・タバコ)

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 クラウドファンディング

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>