

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

痔による痛み・出血・はれ

サブス[®]軟膏 外用痔疾用薬

リドカイン・ジブカイン塩酸塩配合

第2類医薬品

販売名：サブス軟膏

サブス軟膏は、痔による痛み、出血、はれ、かゆみといった不快な症状を改善する痔疾用薬です。

2種類の局所麻酔剤、リドカイン・ジブカイン塩酸塩が患部の痛みを鎮めます。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

〔裏面につづく〕

〔表面からのつづき〕

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和及び消毒

【用法・用量】

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)肛門部にのみ使用してください。

【成 分】（1g中）

成 分	分量	はたらき
リドカイン	10 mg	患部の痛みを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	3.3 mg	
プレドニゾン酢酸エステル	1 mg	患部の炎症をおさえ、はれを鎮めます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.5 mg	患部の出血をおさえます。
クロルヘキシジン塩酸塩	5 mg	患部を消毒し、細菌感染を防ぎます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 mg	患部のかゆみをおさえます。
アラントイン	10 mg	傷の治りをはやめます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	30 mg	患部の血液循環を改善します。

添加物としてゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>