



LAVVAN

ローションタイプ

レーバン®

〈殺菌消毒薬〉

〔使用上の注意〕

「相談すること」

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |


(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PS



レーバン®

ローションタイプ

〔成分・分量〕100ml中

塩化ベンザルコニウム ……0.005g
デシット・デシチン ……0.10g
プロピレングリコール ……3.00g
添加物としてハッカ油を含有します。

〔効能・効果〕

陰部そう痒症、男女陰部清浄、肛門周囲炎、脱肛、肛門裂創、痔核

〔用法・用量〕

脱脂綿又はガーゼに浸して、1日数回患部を清拭してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 外用にのみ使用してください

医薬品

100ml



発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
製造販売元



万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142