

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

痔疾治療薬

第2類医薬品

# レックH<sup>®</sup>坐剤

## 製品の特徴

レックH坐剤は、7種類の有効成分の配合により、痔にともなう痛み・かゆみ・はれ・出血などの症状にすぐれた効果を発揮します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジン※によりアレルギー症状を起こしたことがある人



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 次の症状のある人 むくみ  
(5) 次の診断を受けた人 腎臓病、高血圧、心臓病

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

#### 3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

## 用法・用量

15才以上：1回1個を肛門内に挿入してください。


なお、1日3回まで使用できます。

15才未満の小児には使用させないでください。

(使用方法)

- ・使用に際しては、1個ずつ切りはなし右の図のように開いてください。
- ・坐剤の先から挿入します。
- ・本剤の使用は排便後にしてください。

(坐剤の取り出し方)



○矢印の方向に開いて取り出してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (2) 肛門にのみ使用してください。

## 成分とはたらき

成分	分量 (1個(2.15g)中)	はたらき
リドカイン	60mg	患部の痛み・かゆみをしずめます。
酸化亜鉛	200mg	患部の炎症をおさえ、保護します。
クロルヘキシジン塩酸塩	5mg	細菌による感染を防ぎます。
アラントイン	20mg	傷口の治りを早め、痔の症状をしずめます。
グリチルレチン酸	20mg	患部の炎症をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	20mg	末梢の血行をよくし、患部のはれ・痛みなどの症状をしずめます。
ℓ-メントール	10mg	患部に清涼感を与え、かゆみをしずめます。

添加物として、無水ケイ酸、ハードファットを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、30℃以下の湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 坐剤の先を下に向け、外箱に収納し、立てて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### ●ワンポイント情報

#### 痔を早く治すために

痔は、肛門周囲の血流が悪くなり、うっ血や炎症を起こす疾患です。お薬とともに、日常生活における養生が大切です。

1. アルコール類、タバコ、コーヒーなどの刺激物は控えましょう。
2. バランスの取れた食事を心がけ、便秘を整えましょう。
3. 散歩や体操、入浴などで血行を促しましょう。
4. 患部はいつも清潔にしましょう。



## お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/