

平成21年4月改訂
勃起不全治療剤

この説明書は本剤とともに保管し
服用に際しては必ずお読み下さい

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎
衰弱性射精によく効く

劇 **ハンビロン**
HANBILON 第1類医薬品

人類史上性交は、大変重要な三大欲望の一つです。しかし、現代におけるめまぐるしい生活では、ストレス、食生活、環境等により満足の行く性生活が失われています。

★ハンビロンはこのような性生活での一つの原因である神経性及び老衰性のいわゆるインポテンツや衰弱性射精によく効く治療薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 心臓及び血管系に障害のある人
 - 血圧が90/50mmHgより低い人
 - 生殖器系に障害のある人
 - 脳梗塞、脳出血等や心筋梗塞を起こして6ヶ月以上経っていない人
 - 本剤を服用してアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の勃起不全治療剤

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 高血圧の人
 - 持病のある人、体の弱っている人または高熱のある人
 - 高齢者
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、嚥下困難
精神神経系	頭痛、めまい、疲労
そ の 他	ぜんそく、筋肉の硬直、筋痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は、直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 1ヶ月服用しても症状が良くならない場合

- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき

成分と作用

本剤1カプセル中に次の成分を含んでいます。

成 分	1カプセル中	作 用
塩酸ヨヒンビン	6 mg	仙髄にある反射中枢を刺激して興奮させ特に下腹部並びに性器の血管を拡張する。
硝酸ストリキニーネ	0.5mg	脊髄の反射機能を亢進し、わずかの知覚刺激によっても強度の反射作用を表す。
パントテン酸カルシウム	50mg	代謝機能を高めます。
反鼻末	153.5mg	和漢薬の強壯強精剤で体全体の機能を高めます。

添加物としてカプセルにゼラチン、酸化チタン、赤色3号、黄色4号(タートラジン)、青色1号、ラウリル硫酸ナトリウム及び亜硫酸水素ナトリウムを含有します。

効能・効果

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精

用法・用量

成人は1日1回1カプセルを服用して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量は厳守して下さい。
- 過量の運動時や飲酒時には服用しないで下さい。

養生法

- 食事はビタミン・カロリー及びミネラルに富み、消化の良いものを取り、適度の運動をお勧めします。
- ストレスを貯めないように生活をリラックスさせて下さい。
- 平常は無理をせず、休養が第一です。体力を回復することにより、治りを早めます。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところに保管して下さい。
- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変化します。)

☆お問い合わせ先

〒841-0032 鳥栖市大正町716 日本薬品株式会社 お客様相談室
電話 0942 (82) 2029 FAX 0942 (82) 2036
受付時間：9時より17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

あかひげ薬局

製造販売元



(14A)

日本薬品株式会社

鳥栖市大正町716