

この説明文書は本剤とともに大切に保管し、
服用前に必ずお読みください。

勃起不全治療薬

要指導医薬品

劇 **ハンビロン**
HANBILON

人類史上性交は、大変重要な三大欲望の一つです。しかし、現代のめまぐるしい生活において、ストレス、食生活、環境等により満足のいく性生活が失われています。

ハンビロンは、このような性生活の原因でもある神経性及び老衰性のいわゆるインポテンツや衰弱性射精に効果があります。

ハンビロンは、赤・黄色の不透明の硬カプセルに、灰白色の散剤を充填したカプセル剤です。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 心臓及び脳に障害のある人、もしくは病氣（例えば心筋梗塞、脳梗塞、脳出血等）が完治していない人
- (2) 低血圧症の人
- (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 重篤な肝機能障害のある人
- (5) 女性
- (6) 15歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の勃起不全治療薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 高齢者
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人 排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人

前立腺肥大症、前立腺腫瘍(悪性)、肝臓病、心臓病、腎臓病、高血圧

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、嚥下困難、胃部不快感、腹痛
精神神経系	頭痛、めまい、疲労
その他	興奮、不眠、高血圧、ぜんそく、筋肉の硬直、筋痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は、直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月以上服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

効能・効果

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精

用法・用量

成人は1日1回1カプセルを水又はぬるま湯で服用してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度の運動時や飲酒時には服用しないでください。

成 分 (1カプセル中)

成 分	分 量	作 用
塩酸ヨヒンビン	6 mg	勃起中枢を刺激して、外陰部の血管を拡張し、血液の流入を促進します。
硝酸ストリキニーネ	0.5mg	脊髄の反射機能を亢進し、わずかな知覚刺激でも強度の反射作用を示します。
パントテン酸カルシウム	50mg	代謝機能を高めます。
反鼻末	153.5mg	滋養強壮効果のある生薬成分です。

添加物として、カプセルにゼラチン、赤色3号、黄色4号(タートラジン)、青色1号、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム及び亜硫酸水素ナトリウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

養生法

- (1) 適度な運動をし、ストレスを溜めないように、リラックスした生活を心掛けてください。
- (2) 休養が第一です。平常は無理をせず、体力を回復することにより治りを早めます。

☆お問い合わせ先

日本薬品株式会社お客様相談室

〒841-0032 佐賀県鳥栖市大正町716

電話 0942-82-2029 FAX 0942-82-2036

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

あかひげ薬局

製造販売元



日本薬品株式会社

佐賀県鳥栖市大正町716