

第1類医薬品

MAYADO KINJA-SEI

和漢のチカラを科学し、あなたへ



男子更年期障害及びその随伴症状：
精力減退、視力減退、記憶力減退、全身倦怠、頭重、五十肩

HR239A-01

第1類医薬品

男子強壮保健薬 販売名:金蛇精(糖衣錠) 36錠(内容量)
ご使用に際してこの説明書きを必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

- してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- 次の人は服用しないでください。(1)アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺癌)及びその疑いのある人(腫瘍の悪化をうながすことがあります。)(2)肝機能障害のある人(症状が増悪することがあります。)(3)女性(4)15歳未満の小児
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。ワルファリンカリウム等の抗凝血症、男性ホルモンを含んだ医薬品、他の勃起不全治療薬

⚠ **相談すること**

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)高齢者(アンドロゲン依存性腫瘍が潜在化している可能性があるため)(3)次の症状のある人：排尿困難(4)次の診断を受けた人：前立腺肥大症、肝臓病、心臓病、腎臓病、高血圧
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	興奮、不眠、高血圧

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。口のかわき、軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりしない場合は服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

【効能・効果】男子更年期障害及びその随伴症状(精力減退、視力減退、記憶力減退、全身倦怠、頭重、五十肩 男子更年期以降に於ける男性ホルモン分泌不足による諸症：性欲欠乏、性感減退、勃起力減退、陰萎、遺精)

【用法・用量】通常成人(15歳以上)1回3錠、1日2～3回服用してください。

<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】3錠(成人1回量)中に、メチルテストステロン3.0mg、DL-メチオニン20.0mg、ルチン水和物20.0mg、チアミン硝酸物3.0mg、リポフラビン1.0mg、ニコチン酸アミド30.0mg、アスコルビン酸30.0mg、タウリン45.0mg、ニンジン100.0mg、オウレン50.0mg、ハンピ末300.0mg、カショウ末70.0mg、インヨウカ末70.0mg、サンヤク末70.0mg、ビヤシ末50.0mgを含有します。※添加物としてセルロース、ゼラチン、クロスカルメロースNa、マクロゴール、タルク、アラビアゴム、白糖、セラック、カルナウバロウを含有します。

<成分・分量に関連する注意>(1)本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リポフラビン(ビタミンB2)によるものだから心配ありません。(2)アスコルビン酸(ビタミンC)を含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりして保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)チャックをしっかりしてしてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(5)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先：「くすりの相談室」電話(078)929-0112

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

使用期限 2026 08

製造番号 J0704



HR239B-01