

Tocopherol アルファ-E

ビタミンE製剤

E

330カプセル

第3類医薬品

【用法・用量】

次の量を、食後に服用してください。服用間隔は4時間以上あけてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	1~3回
15歳未満	服用しないでください	

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限(ケース及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町清水谷1269

電話番号 0744-52-3330

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

330カプセル ¥13,000

第3類医薬品

アルファ-E

このケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

Tocopherol

アルファ-E

ビタミンE製剤

E

330カプセル

第3類医薬品

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】1カプセル中

成 分	分 量
トコフェロール酢酸エステル	100mg

添加物：ダイズ油、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール、パラベン、色素(黄色5号、赤色105号)

【効能・効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、上記1～3の症状について、1ヶ月ほど服用しても症状の改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期