

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

メコバラミン主剤

医薬品

ナボリン[®]


NABOLIN[®]

ACTIVE TYPE VITAMIN B₁₂ TABLETS

特徴

腰痛や肩こりは、日常生活の中で経験することの多い症状です。「もんだり動かしたりすると痛い」「同じ場所に痛み・こりがある」「ジーンとしびれている」などの症状は、末梢神経が傷つくことに原因があるのかもしれませんが。同じ姿勢を続けたり、無理な姿勢を繰り返すことが腰や肩の末梢神経に負担をかけ、傷つけることがあります。末梢神経は痛み・しびれを感じて伝える働きをしており、傷がつくとそこから痛み・しびれが起こります。

ナボリンは、末梢神経の傷を修復して腰痛・肩こりを緩和するメコバラミン(活性型ビタミンB₁₂)を主成分としています。メコバラミンは4種類あるビタミンB₁₂の中でも、体内で利用されやすく、末梢神経に直接作用する活性型のビタミンB₁₂です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状 |
|-------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹、かゆみ |
| 消 化 器 | 食欲不振、悪心、胃部不快感 |
| そ の 他 | めまい |
- (2)1カ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢、軟便

効能・効果

次の諸症状の緩和：

腰痛、肩・首すじのこり、手足のしびれ(しびれ感)、神経痛

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

(裏面へつづく)

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	3回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

成分


成人1日量3錠中に次の成分を含みます。

メコバラミン(活性型ビタミンB₁₂)1,500 μ g
酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)10mg

添加物として、タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアゴム、カルナウバロウ、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸Ca、セラック、セルロース、白糖、ポビドン、マクロゴール、無水ケイ酸、無水ケイ酸水加物を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(本剤は光に対して不安定です。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6)使用期限内であっても容器のキャップを一度開けた後は、品質保持の点から6カ月以内に使用してください。箱の内プタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。



包装

ナボリン.....60錠・120錠

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎0120-161-454)
受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日9:00~17:00)

腰痛・肩こり倶楽部でも商品の内容を紹介しています。

<http://www.nabolin.com>



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU36175-4LR