

販売名 VV・コリトL内服液

△【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。軟便、下痢 3.1か月位服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【禁忌・効果】 ●次の症状の緩和・軽減、筋肉疼痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、肩精疲労 ●肩凝り、ただし、これらの症状について、1か月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。 ●次の場合のビタミンB₆の補給 肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 成人（15歳以上）1日1本（50mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

ガラス：ピ ン 金属：キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

中外医薬生産株式会社

三井伊賀市少めが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



VV・コリトL
内服液

【成分・分量】 1日量 100mL (50mL×2) 中
 ベンゾチアミン 138mg、
 オキサミジン末(加工タイプ) 200mg、L-プロリンリン酸エステルトリウム 15mg、L-ドキシン硫酸塩 50mg、ニコチン酸アミド 60mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム 400mg、添加物：エチルアルコール、白糖、果糖、D-ソルビトール、L-システイン、クエン酸、β-グルコース、パルベン、塩酸、エタノール、プロピレングリコール、香料

【保存及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 物の発音に入れ替えないこと(誤用の原因になったり量質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製剤は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、流涙を生じることがあります。よく振ってから服用してください。



O2CRELVV



製造番号
使用期限