

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ側面及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

小林製薬の 医薬品

## 関節痛・腰痛に アンメルシン® コンドロパワー錠

販売名:アンメルシン コンドロパワー錠 ビタミンB1主薬製剤

第3類医薬品

### 特徴

1. 軟骨成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を900mg配合  
(1日量:6錠中)。弾力性や保水性を与え、関節痛の症状を緩和
2. 関節痛、神経痛などの症状を緩和するビタミンB1誘導体(フルスルチアミン塩酸塩)を配合
3. ビタミンの吸収を速めるニンニクエキスを配合

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐、胃部不快感、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
軟便、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果** ●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労、便秘 ●脚気「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること」

●次の場合のビタミンB1の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

**用法・用量** 次の量を水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	朝夕2回
11才以上15才未満	2錠	
7才以上11才未満	1錠	
7才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること

**成分・分量** 1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg	軟骨成分の生成を促す作用があり、関節を正常な状態に保つ
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)	20mg	関節痛、神経痛などの症状緩和
ニンニクエキス	30mg	ビタミンB1の作用を助ける

添加物として、カルメロースCa、ポビドン、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、乳糖、白糖、マクロゴール、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、セルロース、タルクを含有する

**保管及び取扱い上の注意** 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること 2.小児の手の届かない所に保管すること 3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) 4.本剤をぬれた手で扱わないこと 5.瓶の中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

製品のお問合せは、下記のお客様相談室又はお申し込みの  
電話番号にお願いいたします

発売元

 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元

牛津製薬株式会社

〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

MADE IN JAPAN 10161933

製品のご質問・  
ご相談は

電話番号  
**0120-63-9876**  
午前9:00～午後5:00/土、日、祝日除く

オンラインショップ [www2.kobayashi.co.jp](http://www2.kobayashi.co.jp)