



第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンB₁主薬製剤
ひざ・腰・肩 関節の痛みに

ビタミン[®]アクティブ

ビタミン[®]アクティブは…

- 体内で活性化効率の高いベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)と軟骨成分の合成を促すコンドロイチン硫酸ナトリウムのダブルの作用で関節痛、神経痛、腰痛、五十肩などに効果をあらわします。
- 体内でのエネルギー産生に重要な成分として働き、神経や筋肉の働きを助けるアスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物を配合しています。



使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振



(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

軟便、下痢

[効 能]

- 次の諸症状の緩和:
筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給:
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	2~3回
15才未満	服用しないでください	

ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用します。

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕 9錠中

成分	分量	働き
ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	90mg	神経細胞の機能を維持して、神経を円滑に働かせ、腰痛、肩こり、眼精疲労に効果をあらわします。
コンドロイチン硫酸 ナトリウム	600mg	軟骨組織中に存在し、弾力性や保水性を与える役割をしています。軟骨成分の形成及び修復する働きがある為、関節痛・筋肉痛などの緩和に役立ちます。
アスパラギン酸カリウム・ マグネシウム等量混合物	300mg	体内でのエネルギー産生に重要な成分として働き、ビタミンB ₁ の働きを助けます。

添加物として、塩酸グルコサミン、クエン酸Ca、ショウキョウ、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄、リン酸リボフラビンNaを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



このような症状の方に…

- 階段の昇り降りがづらい方
- 立ったり座ったりがづらい方
- 重い荷物を持ち上げて腰を痛めたことがある方
- スポーツや立ち仕事で関節を酷使している方
- 正座すると痛みやこわばりを感じる方
- 五十肩など肩の痛みを感じる方



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号