

# リリービスト内服液

50mL

## 肩こり 腰痛

【ビタミンB<sub>1</sub>B<sub>2</sub>B<sub>6</sub>内服液】



クラフト株式会社

## 眼精疲労の緩和

【成分・分量】1日量(2瓶：100mL)中  
ベンフォチアミン(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体) 120mg、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) 50mg、ニコチン酸アミド 60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 360mg  
添加物として白糖、D-ソルビトール、乳糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、プロピレングリコール、パニコリン、ミツロウ、香料を含有します。(アルコール0.2mL以下)

【成分・分量に関連する注意】

本剤中のビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)により、尿が黄色になる場合があります。

リリービスト内服液(ビタミン主薬製剤)

第3類医薬品

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」

●次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1瓶(50mL)を1日2回(朝夕)服用する。

【使用上の注意】**相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

発売元

クラフト株式会社  
東京都千代田区丸の内1-1-1



4 954007 043217

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 軟便、下痢  
3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(5)一度フタを開けた後は、使用期限内でも、長期保存による服用はしないで下さい。

金属：キャップ

ガラス：瓶

15-7-G

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

明治薬品株式会社  
富山県富山市三郷6番地

お客様相談室

電話：(03)3253-3451

9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

使用  
期限

製造  
番号