

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₂主薬製剤

疲れ・肌あれに

セイムピタン®BB

〈錠剤〉

◆**セイムピタン®BB**は、皮膚・粘膜のビタミンといわれるビタミンB₂を主成分としたB群処方、疲れ、肌あれ、にきび、口内炎に適切な効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、 食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、赤鼻、
目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15 才以上（成人）	1 錠	2 回
15 才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量をお守りください。

裏面もお読みください。

成分・分量

1日量（2錠）中

成分	含量	はたらき
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	38mg	皮膚や粘膜の脂質代謝を促進し、肌あれ、にきび、口内炎に効果があります。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg	タンパク質代謝を促進し、皮膚・粘膜を整えます。
ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg	お肌の代謝に必要なエネルギー産生を助けます。
ニコチン酸アミド	60mg	ビタミンB群の一種で、新陳代謝を高め、皮膚・粘膜を整えます。
ガンマーオリザノール	10mg	米ヌカに含まれる成分で、自律神経のバランスを整えます。
ヨクイニンエキス	100mg (原生薬換算量:1.3g)	ハトムギとして知られ、にきび・肌あれに効果のある生薬です。

添加剤：乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸 Na、ステアリン酸 Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、白糖、ポビドン、酸化チタン、タルク、炭酸 Ca、プルラン、カルナウバロウ、黄色5号 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるものなので心配はいりません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株) お客様相談室

電話 0120-108871 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **東和製薬株式会社**
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地