

0013-6026

開け口

VITAMIN  
C  
ASCORBIC ACID

原末

日本薬局方ビタミンC

ビタミンC  
アスコルビン酸K

第3類医薬品 100g



しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

ご使用上の注意

■ 相殺すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状     |
|------|--------|
| 消化器  | 吐き気・嘔吐 |

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因となり品質が変わります。)
- (4) 一度開封した後は、品質の保持の点から次の点にご注意ください。  
1) 本剤は、湿気の影響を受けやすいので、水滴などを誤ってビンに入れしないでください。  
2) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどビンのフタをよく締めてください。  
3) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号

0 1 2 4 8

しみ、そばかす、  
日やけによる  
色素沈着

ビタミンC VITAMIN C  
アスコルビン酸K

第3類医薬品 100g

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

VITAMIN  
C  
ASCORBIC ACID

日本薬局方ビタミンC

原末



ビタミンC  
アスコルビン酸K

第3類医薬品 100g

E35

【効 果】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。]
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢<br>用量 | 成人(15才以上)  | 7才～14才   |
|----------|--|----------|
| 1日服用回数   | 1g(2杯)   | 0.5g(1杯) |
|          | 1日1～2回服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。(添付のスポーンにて量り服用してください。なお、スポーン1杯が0.5gです。) |          |

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 7才未満は服用しないでください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成 分】 1日量(2g)中

アスコルビン酸(ビタミンC) … 2000mg  
添加物を含んでおりません。

＜成分に関連する注意＞

本剤は尿及び大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地  
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931