


ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



第3類医薬品

# ビタミンC末「クニヒロ」

ビタミンC（アスコルビン酸）は、生理的に重要なビタミンの1つで新鮮な野菜、果物、緑茶などに多く含まれ、人の体内ではつくることができないため、医薬品やこれらの食品から摂取することが必要です。

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期のビタミンCの補給に必要であり、また、ビタミンCは、しみ、そばかすの原因となるメラニン色素の生成を抑制して皮膚の色素沈着を緩和します。さらに、細胞と細胞をつなぐタンパク質であるコラーゲンの生成に役立ち、毛細血管を強化し、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。



## △ [使用上の注意]

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪 心・嘔 吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

下痢

## [成分] 1日量 (2.0g) 中

日本薬局方 アスコルビン酸……………2,000.0mg

### <成分に関連する注意>

本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

(裏面もお読みください)

## [効能・効果]

- 次の場合のビタミンCの補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 次の諸症状の緩和：  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：  
歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。」

## [用法・用量]

次の1回量を水またはお湯で服用してください。

ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (15歳以上)	1 g	1～2回
15歳未満の小児	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 添付のスプーン軽く山盛り1杯が本品約1gです。



## [保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。なお、本剤は特に吸湿しやすい製剤ですから、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 容器内に乾燥剤を入れておりますので、服用の際にはご注意ください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ピンをこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。  
お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520  
受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号  
皇漢堂製薬株式会社

(08.10.改訂)