

\*2012年1月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# ハイシーEクラス<sup>®</sup>

ビタミンE・C製剤

## 特徴

第3類医薬品

- メラニン色素の生成を抑制するビタミンCと血行を改善する作用のあるビタミンEが、しみ・そばかすの緩和にすぐれた効果をあらわします。
- 過酸化脂質の増加を抑える働きのあるビタミンEは、末梢血行障害による手足の冷えや肩・首すじのこりの緩和にすぐれた効果をあらわします。
- 甘酸っぱくて、のみやすい、さらさらの顆粒です。
- カロリーは1包あたり約0.6kcalです。
- ナトリウムを含まず、シュガーレスです。

# HICEE<sup>®</sup>



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。  
フェニルケトン尿症

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

便秘、下痢

#### 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

#### 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能

1. 次の諸症状の緩和  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
2. 末梢血行障害による次の諸症状の緩和  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
3. 次の場合のビタミンE・Cの補給  
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期
4. 次の場合の出血の予防  
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、上記1、2および4の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

(裏面へ続く)

## 用法・用量

次の量を、水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～3回
15歳未満	服用しないこと	

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、  
1日3回服用する場合は朝昼晩に服用すること。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。



## 成分 3包(4.8g、1日最大服用量)中

成分	含量
d- $\alpha$ -トコフェロールコハク酸エステル	300mg
ビタミンCとして	1,500mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) アスコルビン酸カルシウム	〔1,050mg 544.6mg〕
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	12mg


添加物：エリスリトール、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



## マメ知識

### お肌とビタミン

- シミや日焼けによる色素沈着の回復が遅くなった肌は、新しい肌への生まれ変わりをうながす代謝が衰えてきています。こんな肌には、酸素とビタミンなどをからだの中から届けてあげることが大切です。
- ビタミンEは末梢血行をよくし、ビタミンCはシミや日焼けによる色素沈着の緩和に効果を発揮します。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号