

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

ビタミンEC主薬製剤



ビタッシュEC

第3類医薬品

ビタッシュECは、天然型ビタミンE、ビタミンC、ビタミンB₂、ビタミンB₆を配合した製剤で、主にビタミンEの血行障害を改善する作用と、ビタミンCの毛細血管強化作用が協力しあって、効果を発揮します。

- 〈特徴〉
- 1 天然型ビタミンEは数多くのビタミンE同族体のうち、体内での効力がすぐれています。
 - 2 天然型ビタミンE、ビタミンCにビタミンB₂、B₆を配合しています。
 - 3 芳香があり、酸味と甘味のある黄色の顆粒剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈成分・分量〉

1日量3包（6g）中

酢酸d- α -トコフェロール	300mg
酪酸リボフラビン	12mg
塩酸ピリドキシン	50mg
アスコルビン酸	2000mg

添加物としてキシリトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、香料、白糖を含有する。

【ビタミンE、ビタミンC等の作用】

○末梢の血行をよくする

ビタミンEは血行をよくし、体のすみずみまで新鮮な血液を運び、新鮮な酸素と栄養分を体の各組織に補給して、末梢血行障害によっておこる症状（肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ）をやわらげます。

○過酸化脂質の増加を防ぐ

脂質が変質した過酸化脂質は血管などに悪影響を及ぼしますが、ビタミンEは過酸化脂質の増加を防ぎ、ビタミンC・B₂・B₆はその作用をたかめます。

○血管壁を丈夫にする

ビタミンCは血管壁を丈夫にする作用があり、歯ぐきからの出血や鼻出血を防ぎます。

○日やけやしみなどの色素の沈着を防ぐ

ビタミンCはメラニン色素の生成を抑えたり、生じたメラニン色素の色を薄くする働きがあります。またビタミンEは、色素沈着の原因といわれる過酸化脂質の増加を防ぎます。

〈効能・効果〉

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

〈用法・用量〉

次の1回量を1日1～3回服用する。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩に服用する。

年 齢	1回量
15歳以上	1 包
11～14歳	2/3包
7～10歳	1/2包
3～ 6歳	1/3包
3歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号