



第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンEC主薬製剤

ユンケル[®]EC

肩こり、しみ・そばかす、
日やけによる色素沈着、
手足の冷えに

ユンケルECは…

- 天然型ビタミンE、ビタミンC、ビタミンB₂酪酸エステル配合で、しみ・そばかす、日やけによる色素沈着の緩和に効果をあらわす、オレンジ味の顆粒です。
- 肩こり、手足の冷え・しびれなどの末梢血行障害による諸症状をやわらげます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、下痢

【効 能】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足の冷え・しびれ、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンECの補給：
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期



〔用法・用量〕

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	1~3回 (2回の場合は朝夕、3回の場合は朝昼晩服用します)
11~14才	2/3包	
7~10才	1/2包	
7才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕 3包中(1包2g)

成分	分量	働き
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	300mg	末梢の血行を促進し、手足の冷え・しびれなどの末梢血行障害の諸症状に効果をあらわします。
ビタミンC (アスコルビン酸)	1,500mg	メラニンの生成を抑制し、しみ、そばかすなどの緩和に効果をあらわします。またコラーゲンの生成を促進し、鼻出血などの出血予防に効果をあらわします。
ビタミンB ₂ 酪酸エステル (酪酸リポフラビン)	12mg	過酸化脂質を分解し、肩・首すじのこりなどの末梢血行障害の諸症状に効果をあらわします。

添加物として、白糖、トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、還元麦芽糖水アメ、ショ糖脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース、サッカリンNa、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤はビタミンB₂酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

ユンケルECの3つの働き

1. しみ、そばかすなどの色素沈着の緩和に

紫外線は季節を問わず常に地上に降り注がれています。紫外線は色素細胞を刺激してメラニン色素をたくさん作り色素沈着につながります。

ユンケルECはビタミンCの働きによりメラニン色素の増加を防ぎ、しみ、そばかすなどの色素沈着の緩和に効果があります。

2. 肩こり、手足の冷え・しびれなどの症状の緩和に

体の末端の毛細血管は血行障害が起こりやすく、肩がこったり、手足がしびれたり冷たく感じられることがあります。

ユンケルECはビタミンEの抗酸化作用、ビタミンB₂酪酸エステルの過酸化脂質を分解、除去する作用により、末梢血行障害による手足の冷え・しびれや肩こりなどに効果をあらわします。

3. 肉体疲労時などのビタミンECの補給、歯ぐきからの出血予防に

体力消耗時などには、ビタミンCが多量に消費されます。

ユンケルECは肉体疲労時などのビタミンEとCの補給に役立ちます。また、血管壁を強化し出血を予防する働きにより、歯ぐきからの出血予防等にも効果があります。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの

お店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号