

第2類医薬品

インコールA 内服液



50mL

製造販売元



明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

使用上の注意

してはいけないこと 長期連用しないこと。

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 次の症状のある人。むくみ(5) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 皮膚：発疹、消化器：胃部不快感、悪心等又は下痢・便秘の持続・増強(2) まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 3. 数日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量 3瓶(150mL)中
カンゾウエキス(カンゾウとして4,200mgに相当) 1,050mg、オロチン酸コリン 174mg、タウリン900mg、ピリドキシン塩酸塩15mg、バンテノール60mg(アルコール0.53mL以下) 添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコール、ミツロウ、トメントール、安息香酸ベンジル、香料を含有します。

効能・効果 発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮


用法・用量 成人(15歳以上) 1回1瓶(50mL)を1日3回服用してください。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈んで生じることがありますが、よく振ってから服用すること。

使用期限

製造番号



4

全 属：キャップ
ガラス：瓶
15-7-H