

〔使用上の注意〕 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 3.しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。○用法・用量を厳守してください。○本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈澱を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

〔効能〕

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

滋養強壯

肉体疲労時の 栄養補給

**ニンジン・黄精
タウリン配合**

BCAAを含む
5種類のアミノ酸配合

サインエース®内服液

第3類医薬品 50mL

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話 0120-584-419
受付時間 10時~16時(土、日、祝日を除く)

〔成分・分量〕 50mL中

黄精流エキス0.5mL、ニンジン乾燥エキス45mg、タウリン1000mg、L-イソロイシン10mg、L-トレオニン10mg、L-バリン10mg、L-フェニルアラニン10mg、L-ロイシン10mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム4mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg
(アルコール0.9mL以下)
添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、メタリン酸Na、カラメル、香料、ミツロウ、プロピレングリコール、バニン

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

〔ガラス：瓶、金属：キャップ〕



使用期限

製造番号