


この薬は目標1327店  の看板
の薬店チェーン **薬ピク子** だけで
販売しております。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

滋養強壯

スパークビル内服液

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に
相談してください

- (1) 発疹、悪心・嘔吐、下痢などの症状があらわれた場合
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

〔効能〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1アンプル(30mL)を服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は内服にのみ使用し、注射には用いないでください。
- (3) 添付の『アンプルの折り方』を参考にしてストローで服用してください。
- (4) 安全のため直接アンプルには口をつけて飲まないでください。

〔成分〕30mL(1アンプル)中

人参エキス	10mg	タウリン	1,000mg
ロクジョウチンキ	0.1mL	チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	10mg
ゴオウチンキ	0.2mL	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂)	2mg
反鼻チンキ	0.1mL	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	5mg
イカリ草エキス	10mg	シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1μg
ジオウエキス	30mg	ニコチン酸アミド	20mg
リュウガンニクエキス	30mg	イノシトール	100mg
ゴカヒ流エキス	0.6mL	パンテノール	20mg
サンシュユ流エキス	0.3mL	無水カフェイン	50mg
タイソウ流エキス	0.3mL	(アルコール含有0.5mL以下)	
モノトログアヤコールナトリウム	20mg		

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、
パラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム(ビタミンB₂)によるものですから、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、
または下記にお願い申し上げます。

大洋薬品工業株式会社「お客様相談室」電話 072-971-1245
受付時間：9:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)



発売元 **ヒロカク薬品株式会社**

大阪市鶴見区今津中5-4-11

製造販売元 **大洋薬品工業株式会社**

大阪府柏原市清州2丁目2番15号

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)