

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ドックマン®

3錠タイプの総合保健薬

第2類医薬品

ドックマンは、生体に不可欠なビタミン、ミネラルに加え、消化促進成分、滋養強壮成分など21種類の有効成分がバランスよく配合された、働き盛りから高年齢層にかけて幅広くご服用いただける、3錠タイプの総合保健薬です。

“たるい、疲れる、食欲がない”といった症状のある方の栄養補給に適します。

【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

- (2)しばらく服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

【用法・用量】

次の量を水またはぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15才以上）	1コマ（褐色錠、橙色錠と白色錠をそれぞれ1錠）	1～2回
15才未満	服用しないこと	

（用法・用量に関する注意）

(1)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）

(2)服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないでください。

（鉄分の吸収が悪くなることがある。）



【効能・効果】

肉体疲労・食欲不振・栄養障害・病中病後・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質。

【成 分】 (各色1錠中)

褐色錠

イカリ草エキス	50mg	シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	2.5μg
プロザイム6	25mg	アスコルビン酸 (ビタミンC)	50mg
肝臓末	15mg	葉酸	0.5mg
胆汁末	25mg	ニコチン酸アミド	10mg
大豆レシチン	10mg	パントテン酸カルシウム	5mg
ルチン水和物	25mg	トコフェロール酢酸エステル	2.5mg
イノシトール	25mg	(ビタミンE)	
グルクロノラクトン	10mg	エルゴカルシフェロール(ビタミンD ₂)	200国際単位
タウリン	25mg	ビタミンA	2,000国際単位

橙色錠

チアミン硝化物 (ビタミンB ₁)	10mg	溶性ピロリン酸第二鉄	15.7mg
リボフラビン (ビタミンB ₂)	2.5mg		
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)			

白色錠

溶性ピロリン酸第二鉄 · 15.7mg

添加物としてゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳糖、ビタミンE、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリン酸ソルビタン、ラッカセイ油、青色1号、赤色102号、黄色5号、カルナウバロウ、グリセリン脂肪酸エステル、硬化油、酵母、酸化チタン、ステアリン酸M₈、セラック、セルロース、デキストリン、トウモロコシ油、白糖、ヒマシ油、ポピドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、無水ケイ酸、リン酸水素Caを含有します。

〈成分に関する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、これは本剤中のリボフラビン (ビタミンB₂) によるものですので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室

住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電話：03（3946）3610

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>