

第2類医薬品

プラセントップ®  
液

プラセンタ製剤

プラセンタ製剤

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

△使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹
消化器	軟便

2.しばらく服用しても症状の改善が見られない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【成分・分量】 1瓶(30mL)中  
絨毛組織加水分解物… 600.0mg  
(プラセンタエキスとして2,000mg)  
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)  
…5.0mg

ピロキシン塩酸塩(ビタミンB6)… 5.0mg  
ニコチン酸アミド…20.0mg  
無水カフェイン…50.0mg  
\*添加物として、エリスリトール、スクラロース、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉  
本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿または浮遊を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

第2類医薬品

プラセンタエキス(胎盤成分)  
2000mg配合  
プラセントップ®  
液

プラセンタ  
エキスには

- ・アスパラギン酸
- ・トレオニン
- ・セリン
- ・グルタミン酸
- ・グリシン
- ・アラニン
- ・バリン
- ・メチオニン
- ・イソロイシン
- ・ロイシン
- ・チロシン
- ・フェニルアラニン
- ・リジン
- ・アルギニン
- ・プロリン

などのアミノ酸が  
含まれています。

開け口

※軽く押し引きして開けてください。

※軽く押し引きして開けてください。

プラセンタエキス  
ビタミンB1・B6配合

プラセントップ®  
液

《滋養強壮剤》

Placen-Top  
ORAL-SOLUTION

Placen-Top  
ORAL-SOLUTION



製造販売元

30mL

スノーデン株式会社

東京都千代田区岩本町3-7-16

第2類医薬品

【効能・効果】

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体的疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(30mL)を服用してください。15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)よく振ってから服用してください。
- (2)用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせ先

スノーデン株式会社

お客様相談室 電話 03-3866-2459

受付時間 8:50~12:00、13:00~17:30

(土・日・祝は除く)

