

家族みんなのヘルシービタミン

この説明書は、本剤とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読みください。

11種のビタミン+カルシウム・マグネシウム・鉄分配合  
保健ビタミン剤

# マルチビタミンゴールドA

MULTIVITAMIN GOLD-A

マルチビタミンゴールドAは、健康維持に大切な11種のビタミンに、不足しがちなカルシウムなどのミネラルをバランスよく配合した、家族みんなで服用できる保健ビタミン剤です。

○日本人の食生活を考えてつくられています

マルチビタミンゴールドAは、栄養所要量などをもとに日本人の食生活を考え、不足しがちなビタミン・ミネラルを効率よく補給できるようつくられた保健ビタミン剤です。

○11種のビタミンを配合

健康維持にはバランスのとれたビタミン補給が大切です。マルチビタミンゴールドAには、吸収効率にすぐれたビタミンB<sub>1</sub>誘導体(ビスベンチアミン)をはじめ11種のビタミンがバランスよく配合されていますので、効率的なビタミン補給に役立ちます。

○3種のミネラルを配合

ミネラルは、ビタミンとともに生体機能の維持に必要な栄養素です。マルチビタミンゴールドAは、骨・歯の形成や神経・筋肉の機能調整に重要なカルシウムやマグネシウム、血液中の赤血球の構成成分として必要な鉄といった大切なミネラルを配合していますので、お子さまの発育期や妊娠授乳期などに効率のよいミネラルの補給ができます。



## ⚠ 使用上の注意

### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000I.U.(国際単位)以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 悪心・嘔吐     |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

## ■ 効能・効果

●大人(15才以上)の場合

○肉体疲労・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

○滋養強壮、虚弱体質

●小児(7才~14才)の場合

○小児の発育期・偏食児・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害などの場合の栄養補給

○滋養強壮、虚弱体質

## 用法・用量

次の1回量を1日1回服用します。

| 年齢  | 大人(15才以上) | 7才~14才 | 7才未満    |
|-----|-----------|--------|---------|
| 1回量 | 2錠        | 1錠     | 服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)服用の前後30分は、お茶・コーヒー等を飲まないでください。  
(鉄分の吸収が悪くなることがあります。)

## 成分 2錠 (大人1日量) 中

|      |                                   |         |
|------|-----------------------------------|---------|
| ビタミン | ビタミンA油                            | 1.2mg   |
|      | (ビタミンAとして2,000I.U.)               |         |
|      | ビスベンチアミン (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体) | 25mg    |
|      | ビタミンB <sub>2</sub>                | 6mg     |
|      | ビタミンB <sub>6</sub>                | 25mg    |
|      | ビタミンB <sub>12</sub>               | 60μg    |
|      | ニコチン酸アミド                          | 50mg    |
|      | 葉酸                                | 400μg   |
|      | ビタミンC                             | 150mg   |
|      | ビタミンD <sub>2</sub>                | 200I.U. |
| ミネラル | ビタミンEコハク酸エステルカルシウム                | 10.36mg |
|      | ビオチン                              | 60μg    |
|      | 沈降炭酸カルシウム                         | 86.4mg  |
|      | 無水リン酸水素カルシウム                      | 85mg    |
|      | 炭酸マグネシウム                          | 120.2mg |
|      | フマル酸第一鉄                           | 30mg    |

添加物として、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、D-マンニトール、アラビアゴム、カルナウバロウ、ショ糖脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、バレイショデンプン、部分アルファー化デンプン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステル、BHT、BHA、安息香酸Na、デヒドロ酢酸Naを含有します。

- 配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがあります。
- 配合されている鉄分により、便が黒色になることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

