

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

大人(15才以上)1日1回1ビン(100mL)を服用してください。
<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】

1ビン(100mL)中、次の成分を含有します。パンリバーエキス・100mg/コトロイチン硫酸エステルナトリウム・50mg/タウリン・1,000mg/リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B₆)・5mg/ピロキシン塩酸塩(V.B₆)・10mg/ニコチン酸アミド・20mg/無水カフェイン・50mg/アルコール0.5mL以下/添加物として白糖、水アメ、D-ソルビトール、d-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、コハク酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料を含有します。



レバコール®

LEVERCOL 100

第3類医薬品

100mL

100

<成分・分量に関連する注意>(1)本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₆)により、尿が黄色になることがありますがお心配ありません。(2)天然物を使用していますので、まれに沈殿を生じることがありますが薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 976084 061021

使用期限

製造番号

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

お問い合わせ先: 03(3370)7174

製造販売元 **牛津製薬株式会社**
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2