

【使用上の注意】

この薬は、医師の診断により、適切な時期に服用してください。

【服用すること】

1. 服用後、次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。
2. 次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。
3. 次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。

【関係部位】

関係部位	症状
消化器	吐き気、嘔吐

第3類医薬品

ビタミンC1000mg配合
バンローヤルF
 滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に



【効能効果】 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給。

【成分分量】 1本(100mL)中

アスコルビン酸(ビタミンC)	1000mg
ローヤルゼリー	50mg
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)	10mg
リボフラビン(ビタミンB2)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5mg
カフェイン水和物	300mg
ハチミツ	2000mg
(アルコール)	1.5mL以下
添加物：白糖、エタノール、香料、プロピレングリコール、グリセリン。	

(成分分量に關連する注意)
 原を調整させることがある。

【使用上の注意】

この薬は、医師の診断により、適切な時期に服用してください。

【服用すること】

1. 服用後、次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。
2. 次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。
3. 次の症状があらわれれば、副作用の恐れがあるため、速に医師に相談してください。

【関係部位】

関係部位	症状
消化器	吐き気、嘔吐

第3類医薬品

ビタミンC1000mg配合
Vitamin C 1000mg
バンローヤルF
 滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

100mL×10本

日水製薬医薬品販売株式会社

DK1804

【保管および取扱上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 ☎0120-149-931

100mL×10本

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

ビタミンC1000mg配合
Vitamin C 1000mg
バンローヤルF

第3類医薬品

【用法用量】 次の1回量を1日1回服用する。

年齢	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

製造番号◆使用期限(年/月)

日水製薬医薬品販売株式会社
 東京都台東区上野1-18-11
 電話：03-3837-0987

日水製薬医薬品販売株式会社