

2011年10月
(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ビタミンD₃・マグネシウム配合 カルシウム剤

新カルシチュウD₃

新カルシチュウD₃の特徴

1. 1日1回、2錠(15歳以上)服用するだけで1日分のカルシウムが摂れます。
2. カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃、さらにマグネシウムを配合しています。
3. 服用しやすい、かみくだけのソフトチュアブル錠。
水なしでそのまま服用できます。
4. さわやかなヨーグルト風味です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能 ・ 効 果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、老年期、発育期

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回 必ずかみくだくか口中で溶かして服用して下さい。
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にすることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。


成分・分量

本剤は、チュアブル錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

沈降炭酸カルシウム……………1525mg
(カルシウムとして……………610mg)
炭酸マグネシウム……………118.4mg
(マグネシウムとして……………30mg)
コレカルシフェロール(ビタミンD₃)……………400IU
添加物: 中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、D-ソルビトール、ポビドン、ステアリン酸Mg、香料、エチルバニリン、バニリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めて下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をボトルに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ボトルの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) ボトルの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っず服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

F