

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

滋養強壮薬

活力・M

第1類医薬品

活力・Mはニンジンエキス、イカリソウエキス、トシシエキス等の強壮生薬に男性ホルモンのメチルテストステロンを配合したすぐれた滋養強壮剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください。

- (1) アンドロゲン依存性悪性腫瘍(例えば前立腺癌)及びその疑いのある人(腫瘍の悪化をうながすことがあります。)
- (2) 肝機能障害のある人
(症状が増悪することがあります。)
- (3) 女性
- (4) 15歳未満の小児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 高齢者(アンドロゲン依存性腫瘍が潜在している可能性があるため)
- (3) 今まで薬などによるアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- (4) 次の症状がある人
排尿困難

- (5) 次の診断を受けた人
肝臓病、前立腺肥大症、前立腺腫瘍(悪性)、心臓病、腎臓病、高血圧

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：

肉体疲労、虚弱体质、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振

【用法・用量】

次の量をなるべく食後約30分以内に、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください。	

・定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1日量(2カプセル)中

成 分	分 量	成 分	分 量
メチルテストステロン	10mg	ゴシュユ末	80mg
ゴオウ	10mg	インチンコウ末	80mg
ニンジンエキス	30mg	オウギ末	100mg
イカリソウエキス	50mg	ヨクイニン末	80mg
トシシエキス	10mg	ケイヒ末	80mg
パントテン酸カルシウム	8mg	サイコ末	60mg
サンヤク末	100mg	ジオウ末	50mg
サンシュユ末	60mg	乾燥酵母	150mg

添加物として、トウモロコシデンプンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)瓶のフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのために変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)瓶の中の詰め物は、輸送中にカプセルが破損するのを防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又は下記までにお問い合わせください。

東南製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0014 東京都豊島区池袋3-32-1

電話：03-3988-8958

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元



東南製薬株式会社

東京都豊島区池袋三丁目32番1号