

⚠ 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 血圧の高い人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	軟便、下痢

- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲ 用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量 10g を、水約 600mL をもって煮て約 400mL に煮つめ、汁をこして取り去り、食前又は食間 3 回に分服してください。

(用法・用量に関する注意)

◎服用に際して、定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

▲ 効能及び効果

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え性

▲ 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
- 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
- 服用に際しては、説明書をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17
電話 06(6941)7164

