

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# カタセ錠<sup>®</sup>

〔有核錠〕

－ カルシウム剤 －

第3類医薬品

カルシウムは、丈夫な骨や歯をつくる上で必須の栄養素であるとともに、筋肉の運動や神経活動を調節するなど、健康を維持する上でも重要な役割をはたしています。

カタセ錠は、身体にとって大切な栄養素でありながら食事で不足しがちなカルシウムを補給するとともに、酸性体質、虚弱体質を改善するためにつくられた有核錠のカルシウム剤です。

## 【使用上の注意】



### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。  
医師の治療を受けている人。
2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
便秘
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

## 【効能・効果】

酸性体質<sup>\*</sup>、虚弱体質、栄養補給、妊産婦および授乳婦の栄養補給。

<sup>\*</sup>酸性体質：体が虚弱で、病気にかかりやすい体質をいいます。

## 【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	3 錠	2 回
7 才以上 15才未満	2 錠	
5 才以上 7 才未満	1 錠	
5 才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で、服用してください。

## 【成分】 (6錠中)

### 外皮:

沈降炭酸カルシウム…………… 1,800 mg  
(カルシウムとして720 mg)

ヨクイニン末…………… 250 mg

### 内核:

モルシン…………… 100 mg


ヨクイニン末…………… 50 mg

銅クロロフィリンナトリウム…………… 10 mg

トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE) …… 10 mg

添加物としてD-ソルビトール、タルク、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、ケイ酸A<sub>1</sub>、硬化油、ステアリン酸M<sub>8</sub>、セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、無水ケイ酸、無水ケイ酸水加物を含有します。

## カタセ錠の断面



- カタセ錠は、配合成分の安定性を保つため、  
内核を外皮でつつんだ有核錠になっています。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

1) 購入した薬局・薬店

2) 全薬工業お客様相談室

住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電話：03 (3946) 3610

受付時間：9:00～17:00

(土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>