丹陽印

登録 TANYO 商標

第３類医薬品

日本薬局方

吉見コウカ

500ｇ

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

冷え性、血色不良

用法及び用量

成人(15 歳以上)は 1 日量 3g を、水約 600ml をもって煮て約 400ml に煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
(2) 小児の手の届かない所に保管してください
(3) 他の容器に入れ替えないでください

吉見製薬株式会社
大阪市中央区船越町 2-1-17
電 話 06（6941）7164

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http：//www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 フリーダイヤル

4 951225 120997