

アレルギー用薬

# レスタミンコーワ糖衣錠

じんましん、しっしんなどのアレルギー性疾患は、その人の体質や、健康状態に応じて、からだの中の過敏反応（アレルギー反応）の結果としてあらわれるといわれています。このようなじんましん、しっしんがおこった時、おこった部分に軟膏を塗ることも症状をやわらげる治療法として好結果を期待できますが、更に一歩すすめて、からだの中におこったアレルギー反応を改善する抗アレルギー剤の服用が望ましいと言えます。

レスタミンコーワ糖衣錠は、からだの中におこっているアレルギー反応を改善しつつ、じんましん、しっしんなどのアレルギー性疾患を治療します。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
（眠気があらわれることがある。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 服用時は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
口のかき

## 効能・効果

じん麻疹、湿疹、かぶれ、かゆみ、鼻炎

## 用法・用量

下記の量を服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満の幼児	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量(9錠中)

成 分 ・ 分 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 90mg	アレルギー反応を抑え、じんましん、しっしん、かぶれ、かゆみ、鼻炎の症状を改善します。


〔添加物〕乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、炭酸Ca、タルク、白糖、アラビアゴム、ゼラチン、リン酸水素Na、酸化チタン、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤につくと内容成分の変化のもととなるので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないこと。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄すること。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨てること。
- (6) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合があるので、服用のつどキャップをよくしめること。
- (7) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



 製造販売元 **興和株式会社**  
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14