

Oxydol

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。また、必要なときは読めるように大切に保管してください。

日本標準商品分類番号 872614

外用殺菌消毒剤 第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール

「タイセイ」P

100mL



製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷999-1
0942-53-4662(代表)

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 症状が広範囲の人。
- (4) 濃い痒みやひどいけとの人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
反心	発熱・発赤・むくみ

使用期限

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

傷の消毒・洗浄

【用法・用量】

そのままの濃さは2~3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う。

＜用法用量に、関連する注意＞

- (1) 顔面など反心の敏感な箇所を適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること。
- (2) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診察を受けること。
- (4) 外用のみ使用すること。

【成分・分量】

遊離化水素2.5~3.5w/v%を含む。

製造番号

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 保存中にビン内の圧力が高くなっていることがあるのでビンの口を顔に近づけないようにしてキャップをあげること。
- (2) 直射日光をさけるべく冷所(30℃以下)に密封して保管すること。
- (3) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (4) 他の容器に入れかえないこと。
(換用の原因になったり、品質が変わる。)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

本体:PE
キャップ:PP



4 987297 303266

L160803 8010