

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

皮膚疾患・外傷治療薬

オロナイン[®]H軟膏

0767

<p>にきび、吹出物には少量をかるくすりこんでください。べとつく場合は、タオル、ガーゼ等で拭きとってください。</p> 	<p>きず(きりきず、すりきず、つききず)には患部を清潔にして塗ってください。オロナインH軟膏はきず口を消毒し、化膿を防ぎます。</p> 	<p>軽度のやけどの場合には、患部に塗ってガーゼを当ててください。化膿を防ぎます。</p> 	<p>ナイフ、カミソリなどによるきりキズにご使用ください。オロナインH軟膏の殺菌作用により化膿を防ぎます。</p> 
<p>水虫にはお風呂上りにすりこむのが効果的ですが、毎日忘れぬよう根気よくお続けください。なお、じゅくじゅくした湿潤性の水虫には適当ではありません。</p> 	<p>いんきん、たむし、しらくも、はたけにもオロナインH軟膏をご使用ください。</p> 	<p>山や海で思わぬきず等に慌てた経験がおありでしょう。オロナインH軟膏はご家庭ばかりでなく、外出や旅行のときの携帯薬としても使用できます。</p> 	<p>冬のひび、しもやけ、あかぎれには水仕事のあとやお風呂上り、お寝み前によくすりこんでください。</p> 



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 湿疹(ただれ、かぶれ)
- (2) 化粧下
- (3) 虫さされ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

(裏面へつづく)

- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人
- (6) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

にきび、吹出物、はたけ、やけど(かゆいもの)、ひび、しもやけ、あかぎれ、きず、水虫(じゅくじゅくしていないもの)、たむし、いんきん、しらくも

用法・用量

患部の状態に応じて適宜ガーゼ、脱脂綿等に塗布して使用するか又は清潔な手指にて直接患部に応用します。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (4) 患部やその周囲の汚れを落としてから使用してください。

成分

本剤は殺菌作用を有するグルコン酸クロールヘキシジンを配合した親水性軟膏です。1g中にグルコン酸クロールヘキシジン液(20%)を10mg含有します。

なお、添加物としてラウロマクロゴール、ポリソルベート80、硫酸AVK、マクロゴール、グリセリン、オリブ油、ステアリルアルコール、サラシミツロウ、ワセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、香料、精製水を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (5) 瓶容器はガラス製ですので、強い衝撃はさけてください。容器が破損し、けがをするおそれがあります。



包装

10gチューブ入、30g 瓶入、100g 瓶入、250g 瓶入、500g 瓶入

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大塚製薬株式会社 医薬情報センター

〒108 8242 東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー13F

電話番号(03)6717 1400(代表)

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



販売元

大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9

製造販売元

株式会社**大塚製薬工場** 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

皮膚疾患・外傷治療薬

オロナイン[®]H軟膏

0816

<p>にきび、吹出物には少量をかるくすりこんでください。べとつく場合は、タオル、ガーゼ等で拭きとってください。</p> 	<p>きず(きりきず、すりきず、つききず)には患部を清潔にして塗ってください。オロナインH軟膏はきず口を消毒し、化膿を防ぎます。</p> 	<p>軽度のやけどの場合には、患部に塗ってガーゼを当ててください。化膿を防ぎます。</p> 	<p>ナイフ、カミソリなどによるきりキズにご使用ください。オロナインH軟膏の殺菌作用により化膿を防ぎます。</p> 
<p>水虫にはお風呂上りにすりこむのが効果的ですが、毎日忘れぬよう根気よくお続けください。なお、じゅくじゅくした湿潤性の水虫には適当ではありません。</p> 	<p>いんきん、たむし、しらくも、はたけにもオロナインH軟膏をご使用ください。</p> 	<p>山や海で思わぬきず等に慌てた経験がおありでしょう。オロナインH軟膏はご家庭ばかりでなく、外出や旅行のときの携帯薬としても使用できます。</p> 	<p>冬のひび、しもやけ、あかぎれには水仕事のあとやお風呂上り、お寝み前によくすりこんでください。</p> 



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。

- (1) 湿疹(ただれ、かぶれ)
- (2) 化粧下
- (3) 虫さされ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

(裏面へつづく)

- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人
- (6) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

にきび、吹出物、はたけ、やけど(かるいもの)、ひび、しもやけ、あかぎれ、きず、水虫(じゅくじゅくしていないもの)、たむし、いんきん、しらくも

用法・用量

患部の状態に応じて適宜ガーゼ、脱脂綿等に塗布して使用するか又は清潔な手指にて直接患部に応用します。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (4) 患部やその周囲の汚れを落としてから使用してください。

成 分

本剤は殺菌作用を有するグルコン酸クロールヘキシジンを配合した親水性軟膏です。1g中にグルコン酸クロールヘキシジン液(20%)を10mg含有します。

なお、添加物としてラウロマクロゴール、ポリソルベート80、硫酸AVK、マクロゴール、グリセリン、オリブ油、ステアリルアルコール、サラシミツロウ、ワセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、香料、精製水を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 外箱及び容器に表示の配置期限をすぎた製品は使用しないでください。

包 装

20gチューブ入

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大塚製薬株式会社 医薬情報センター
〒108 8242 東京都港区港南二丁目16番4号 品川ランドセントラルタワー13F
電話番号(03)6717 1400(代表)
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



販売元

大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9

製造販売元

株式会社大塚製薬工場 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115