

指定医薬部外品

C₂H₅OH
C₃H₈O₃
KOH

グリセリンカリ液

Glycerin and Potash Solution

そのまま塗って、
ひび、あかぎれに
ご使用頂けます。

水酸化カリウムは皮膚の角質を
軟化し、グリセリンは皮膚軟化及
び乾燥防止作用により、皮膚の
亀裂に対し効果があります。

500mL

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと
・湿潤やただれのひどい人

☑ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談す
ること

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果 ひび、あかぎれ

用法・用量 そのまま適量を患部に塗布する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保
護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で
洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専
門医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- (5) 長期連用しないこと

販売名:グリセリンカリ液「コザカイ・P」 I12-FL

成分・分量

本品100mL中
 日局 水酸化カリウム………0.3 g
 日局 グリセリン………20mL
 日局 エタノール………25mL
 添加物:香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所
に保管すること
- (2) 直射日光をさけ、湿気の少
ない涼しい所に密栓して
保管すること
- (3) 誤用を避け、品質を保持す
るため、他の容器に入れか
えないこと
- (4) 使用期限を過ぎた製品は
使用しないこと



キャップ
ボトル
外装フィルム

製造販売元

小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9

発売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16



大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

使用期限:

製造番号: