

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 化膿性皮膚疾患治療剤



# コ-フル



(軟膏)

第3類医薬品

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

飲んだり、眼科用として使用しないでください



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 今までに、薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 患部が広範囲の人
  - 湿潤やただれのひどい人
  - 深い傷やひどいやけどの人
  - 医師の治療を受けている人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- 数日間使用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

火傷(やけど)、切疵(きりきず)、擦過傷(すりきず)、凍傷、乳ぎれ、汗疱(初期のあせも)、皮膚のただれ、床ずれ、くつずれ、汗疹(あせも)、潰瘍、湿疹、肛門周囲炎、会陰裂傷、口唇周囲炎、臍帯脱落后のびらん

### 用法・用量

1日2～3回患部に適量をすりこむか、又はガーゼにのぼして貼ります。

### 用法・用量に関する注意

- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。
- 外用にのみ使用してください。
- 乳ぎれに使用になる場合には、ガーゼ等でよく拭いてから授乳してください。

裏面もお読みください

**有効成分・分量 (100g中)**

成分	含量	はたらき
アクリノール	0.5g	各種化膿菌、特に連鎖球菌・ウエルシュ菌・ブドウ球菌・淋菌に対し、静菌及び殺菌作用があります
酸化亜鉛	5g	皮ふのたんぱく質と結合して被膜をつくるので、消炎作用、緩和な防腐作用があります。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面などを乾燥させます

※添加物として、白色ワセリン、タルク、モクロウ、パラフィン、カンフル、ビタミンAアセテート、カルシフェロール、香料を含有する。

**保管及び取り扱い上の注意**

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所にフタをして横にならないように保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
- (4) 衣服等に付くと色が落ちにくいので、ご使用の際は十分に注意してください。

## &lt;お問い合わせ先&gt;

- (1) 購入した薬局・薬店
- (2) 協和新薬株式会社

住所：埼玉県草加市小山1-28-8

電話：048-942-1445

[受付時間：9時～17時まで(土・日・祝日を除く)]

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

<製造販売元> 協和新薬株式会社  
埼玉県草加市小山1-28-8