

化膿止め薬

新ホモナール[®]軟膏

NEW HOMONAL OINTMENT

皮膚の表面には多くの細菌が常在しています。皮膚を不潔にしていたり、ちょっとした傷でも放っておくと細菌感染により、化膿や症状の悪化を招くことがありますから、日ごろの注意と早めの治療が大切です。

新ホモナール軟膏は、抗菌範囲の広いサルファ剤スルファジアジンを主剤にした化膿性皮膚疾患治療剤で、スルファジアジンの作用をたかめる尿素、痛み・かゆみといった不快な症状をしずめるリドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合した白色の軟膏です。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

■ 効能・効果

化膿性皮膚疾患、とびひ、面疔

■ 用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

チューブ穴のあけ方（右図）

キャップを逆にして、チューブに強く押し当てます。



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分と作用

成分 12g中	作用
スルファジアジン600mg	患部の化膿をおさえ、おでき、とびひといった化膿性皮膚疾患の治療に効果をあらわします。
尿素.....600mg	スルファジアジンとともに働き、治療をたすけます。
リドカイン.....120mg	局所の痛み・かゆみといった不快な症状をしずめます。
ジフェンヒドラミン 塩酸塩.....120mg	

添加物として、マクロゴール、ラウロマクロゴール、エドト酸Na、BHT を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>