



第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【特徴】

- JPS温感ハップは、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった温感ハップ剤です。
- JPS温感ハップは、トウガラシエキスを配合していますので心地よい温感刺激を与え、肩こり、腰痛、関節痛などの症状を改善します。
- JPS温感ハップは、タテ・ヨコに伸びる基布を使用していますので、ピッタリフィットします。
- JPS温感ハップは、固定用粘着シートがついていますので屈伸部位にも楽に固定できます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はがしひいてから使用してください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してから使用してください。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】 膜体100g(875cm²) 中

| | | | |
|--|-------|---------------|------|
| サリチル酸メチル | 1.5g | オウバク軟エキス | 1.0g |
| l-メントール | 0.5g | (原生薬換算量3.3g) | |
| dl-カンフル | 0.5g | トウガラシエキス | 0.3g |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.3g | (原生薬換算量3.75g) | |
| グリチルレチン酸 | 0.05g | | |
| 添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、 ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、カオリソ、pH調整剤、その他3 成分を含有する。 | | | |

ここを押してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔包 装〕 10枚入(1枚：14cm×10cm)

<お問い合わせ先>

帝國製薬株式会社 お客様相談室 電話(0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)



副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



4 987438 031164