

この説明書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

あせも・かぶれ・しっしん

アセモタミー

一般に皮膚疾患においては、患部を乾燥させてさわやかな感じを保つと同時に、痛みやかゆみを抑えることが大切です。アセモタミーは消炎作用、抗アレルギー作用を有するヒドロコルチゾン酢酸エステルをはじめ、痛み・かゆみを抑えるアミノ安息香酸エチル、血行促進作用を有するトコフェロール酢酸エステルを配合した軟膏です。また、基剤は患部を乾燥させる効果にすぐれ、汗や分泌物による不快感を除きます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

裏面もお読みください。

■効能・効果

あせも、かぶれ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

■用法・用量

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

■成分・分量（100g中）

ヒドロコルチゾン酢酸エステル…………… 0.5g

アミノ安息香酸エチル…………… 2.0g

トコフェロール酢酸エステル…………… 0.5g

酸化亜鉛…………… 30.0g

添加物として、オリーブ油、ゴマ油、卵黄油、白色ワセリン、サラシミツロウ、イソプロピルメチルフェノール、バレイシヨデンブン、香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 **0598-30-5376**

受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142