

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

関節痛・腰痛・筋肉痛
エパテックA[®]ゲル
経皮鎮痛消炎剤

第2類医薬品

〔特 徴〕

- 筋肉痛や関節痛，腰痛などの不快な痛みに，優れた効果を発揮します。
- 患部に直接塗るだけで素早く吸収し，痛みをやわらげます。
- べたつかず，サラッとした使い心地です。

⚠使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等を含む)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - * (3) 次の医薬品によるアレルギー症状(発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等)を起こしたことがある人。
チアプロフェン酸を含有する解熱鎮痛薬，スプロフェンを含有する外用鎮痛消炎薬，フェノフィブラートを含有する高脂血症治療薬
 - * (4) 次の製品によるアレルギー症状(発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等)を起こしたことがある人。
オキシベンゾン，オクトクリレンを含有する製品(日焼け止め，香水等)
 - * (5) 光線過敏症を起こしたことがある人。
 - (6) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (7) 15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
- (1) 目の周囲，粘膜等。
 - (2) 湿疹，かぶれ，傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤の使用中は，天候にかかわらず，戸外活動を避けるとともに，日常の外出時にも本剤の塗擦部を衣服，サポーター等で覆い，紫外線に当てないでください。なお，塗擦後も当分の間，同様の注意をしてください。(紫外線により，使用中又は使用後しばらくしてから重篤な光線過敏症があらわれることがあります。)

**



使用中および使用後少なくとも4週間は
塗擦部を紫外線にあてないでください。

- * 4. 本剤を使用している間は，次の製品を使用しないでください
オクトクリレンを含有する製品(日焼け止め等)
- 5. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は，直ちに使用を中止し，この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用中又は使用後，次の症状があらわれた場合
まれに重症化して発疹・発赤，かゆみ等の症状が全身に広がる場合があるので，下記の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し，患部を遮光して医師の診察を受けてください。なお，使用後しばらくしてから症状があらわれることがあります。また，紫外線により症状があらわれたり，悪化したりすることがあります。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------------|---------------------------------------|
| 皮 膚 (患部) | 発疹・発赤，かぶれ，かゆみ，はれ，刺激感，水疱・ただれ，色素沈着，皮膚乾燥 |

(必ず裏面もお読みください)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 接触皮膚炎、 光線過敏症 | 塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。 |

(2) 1週間程度使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

筋肉痛、関節痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、肘の痛み（テニス肘など）、腱鞘炎（手・手首の痛み）、打撲、捻挫

〔用法・用量〕

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。


〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 使用後は手を洗ってください。




ご使用のアドバイス

- 1日1～4回、痛い所とその周辺、関節部位はその周囲全体に塗ってください。



〔使用量の目安〕

- 指など…………… 1cm弱
手首、ひじなど …… 1～2cm
肩、腰、ひざなど …… 2～3cm



〔成 分〕

1g中

ケトプロフェン……………30mg
添加物として、フェニルエチルアルコール、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、オキシベンゾン、ジブチルヒドロキシトルエン、ジイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース及び香料を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れがえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 本剤が机、床、家具等の塗装面に付着すると変色することがありますので、取扱いに注意してください。
- (5) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投げないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

