

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

肩こりに伴う肩・腰・関節の痛みに

直接効果 カルテバ ハイパップ

第2類医薬品

微香・冷感 密着・伸縮

24枚入(6枚×4袋)
1枚10×14cm

特徴

有効成分のインドメタシンが、炎症や痛みに直接働きかけ消炎・鎮痛効果を発揮します。また基剤中の水分が、患部を冷却します。

〔使用上の注意〕

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能又は効果〕


腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

〔用法及び用量〕

年 齢	使用 方 法
11歳以上	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
11歳未満	使用しないでください。

使用方法の例

● 関節の部位へ貼付する場合は、図のようにフィルムの上からハサミで切込みを入れてご使用ください。



＜用法及び用量に関連する注意＞

- 用法及び用量を守ってください。
- 11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 連続して2週間以上使用しないでください。

〔成分及び分量〕

本品1枚(膏体14g)中、次の成分を含有します。

成 分	分 量	主なはたらき
インドメタシン	52.5mg	患部のはれを抑え、痛みをしずめます。

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ゼラチン、カオリン、D-メントール、尿素、エド酸Na、グリセリン、CMC-Na、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、酸化チタン、ポリソルベート80、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール、pH調整剤、その他3成分を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 未使用分は袋に入れ、開口部のチャックを確実に閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

販売名:カルテバハイパップ

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

®登録商標
1611V

お問い合わせ先

ダンヘルスクエア株式会社 お客様相談室

TEL 06-6441-0547 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元: ダンヘルスクエア株式会社 大阪市西区土佐堀1丁目4番11号
製造販売元: 帝國製薬株式会社 香川県東かがわ市三本松567番地

この部分を押し
開けてください。