

第②類医薬品

# コーチゾン軟膏

しっしん・かゆみ・アレルギー性皮膚炎に

## 皮膚病薬


### 注意

1. 次の部位には使用しないでください  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください
5. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
6. 小児の手の届かない所に保管してください

セルフメディケーション

税 控除 対象

10g



製造販売元 株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**皮膚疾患治療薬 販売名:コーチソン雪の元**

第②類医薬品

**！ 使用上の注意**

- ⊗してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
  2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
  3. 長期連用しないでください



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位   | 症 状                           |
|--------|-------------------------------|
| 皮膚     | 発疹・発赤、かゆみ、はれ                  |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**用法・用量**

1日2～3回患部に適量を塗擦してください。  
あるいは症状に応じガーゼに延ばして患部に貼付してください。  
<用法・用量に関連する注意>  
(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないように注意してください。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

**効能・効果**

アレルギー性皮膚炎、疱疹状皮膚炎、あかぎれ、かゆみ止め、くさ、しっしん、しもやけ、ひび、凍傷、やけど、痔疾、あせも、皮膚そう痒症、肛門そう痒症、虫さされ

**成分・分量**

(100.3g)中

| 成 分           | 分量   | 成 分       | 分量   | 成 分  | 分量    |
|---------------|------|-----------|------|------|-------|
| ヒドロコルチン酢酸エステル | 0.5g | ジフェンヒドラミン | 0.5g | 酸化亜鉛 | 8.73g |



添加物として、バレイシヨデンブ、dl-カンフル、d-ボルネオール、パラフィン、ワセリンを含有します。

**保管及び  
取扱上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

2301-PLP



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室  
TEL 0744-22-2440

(受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く))