

# 快生膏<sup>®</sup>

第3類医薬品

## 【特長】

- はりやすい丸くて小さなパッチ型です。
- サリチル酸グリコールの鎮痛消炎作用で、痛みやコリをやわらげます。
- 血行促進作用のあるノニル酸ワニルアミドを配合しています。
- 抗炎症作用のあるグリチルレチン酸を配合しています。

## ⚠️【使用上の注意】

### ❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

### 1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



### 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、ヒリヒリ感

### 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片をはり、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (4) 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。  
また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- (5) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール	3.0g
l-メントール	7.0g
グリチルレチン酸	0.19g
ノニル酸ワニルアミド	0.10g

添加物としてBHT、生ゴム、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他1成分を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】 直径 23 mm 120 枚（6 枚×10 シート×2 袋）

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1


日本製 【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

 0120-149-931