

日本薬局方

第3類医薬品

吉見サンシシ末

用法及び用量

若干の小麦粉と混ぜ、水で練って外用する

効能又は効果

うちみ、ねんざ



4951225421339

日本薬局方

サンシシ末

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6 日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲ 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
- 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- 服用に際しては、説明書をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17
電話 06(6941)7164

