

のびやすく、塗りやすい乳剤性軟膏

外用湿疹・
皮ふ炎用薬**新レスタミン^γ軟膏**

湿疹や皮ふ炎、かゆみなどの治療には、皮ふ科領域を中心に外用のジフェンヒドラミン製剤が使用されています。

新レスタミン^γ軟膏には、有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩が、OTC医薬品としての配合上限量である2.0%処方されています。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、かゆみなどのもとであるヒスタミンの働きをおさえて、かゆみをおさえると同時に、湿疹や皮ふ炎などにすぐれた効きめをあらわします。

また、本剤はやわらかく、のびやすい乳剤性軟膏です。ですから、かゆみなどの広い患部にも塗り広げやすく、使用感のよいお薬となっております。その上、本剤は無香料・無着色・低刺激性です。

湿疹や皮ふ炎などは、搔くことによって悪化してしまうこともあります。本剤をご家庭に常備して、皮ふがかゆくなったり、赤いポツポツ、ブツブツなどの症状が出たら早めにご使用ください。

⚠️ 使用上の注意**相談すること****1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**(1) 使用后、次の症状があらわれた場合**

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合**成分・分量(1g中)**

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg	湿疹やかゆみ等のもとになるヒスタミンの働きをおさえ、湿疹やかゆみ等にすぐれた効きめがあります。

〔添加物〕ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、エドト酸Na、パラベン、クエン酸、水酸化Na

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん




用法・用量

1日数回患部に適量を塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。

●容器の正しい使い方

		
1.まずキャップをはずして、キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてください。	2.やわらかい乳剤性軟膏のため、チューブを軽く押しして適量を取り出し、お使いください。	3.使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

※使用後はチューブの口元をきれいに拭きとり、乳剤性軟膏がまわりに付着しないように注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14