

水虫・たむし治療薬

マセトロン T

製品の特徴

マセトロン Tは、水虫の原因菌である白癬菌^{はくせんきん}に対する抗菌作用を持つ成分と患部のかゆみや炎症をしずめる成分の配合により、かゆい水虫・たむしにすぐれた効果を発揮します。有効成分の皮ふへの浸透を高める基剤をベースとした、皮ふによくなじむ使用感のよいクリームタイプの軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等
 - (2) 湿疹
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 乳幼児
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 患部が顔面又は広範囲の人
 - (6) 患部が化膿している人
 - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多いと考えられます。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

いんきんたむし、ぜにたむし、みずむし

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (2) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成分	分量 (100g中)	はたらき
ウンデシレン酸	5.0g	水虫・たむしの原因菌(白癬菌)に対する抗菌作用があります。
トリメチルセチルアンモニウム ペンタクロロフェネート	1.0g	
木樺皮エキス (木樺皮として2.5g)	0.5g	
グリチルレチン酸	0.5g	患部のかゆみや炎症をおさえます。
ジフェンヒドラミン	0.5g	

添加物として、ラウリル硫酸Na、香料、プロピレングリコール、ステアリアルアルコール、マクロゴール、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンオレイルエーテルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

ワンポイント情報

水虫・たむしは、カビの一種の白癬菌などが、皮膚表面の角質層に寄生して起こる皮膚病です。白癬菌は足の指のあいだなど湿ったところに寄生しやすく、感染すると激しいかゆみや痛みを伴い、皮膚がふやけたり、水疱を生じたり、逆に硬く厚くなることがあります。二次感染や悪化しやすいため、早めの治療が大切です。

また、症状が消失しても角質層内に白癬菌が生き残っていることが多いため、途中で治療を止めると再発しやすいことも水虫・たむしの特徴です。症状がなくなっても、根気よく治療を続けることが必要です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>