

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第3類医薬品

かゆみを伴うカサカサした皮膚に


# オイラックス<sup>®</sup>潤乳液

乾燥性皮膚用薬


### オイラックス潤乳液の特徴

1. 尿素の作用により、角質の水分保持力を増加させ、カサカサした皮膚に潤いをあたえます。
2. クロタミトン、ジフェンヒドラミン、グリチルレチン酸の作用により不快なかゆみをしずめます。
3. 少量で広い範囲に塗れる乳液です。
4. Water in Oilタイプ(W/O型)の乳液なので、皮脂膜(W/O型)となじみやすく、効果的にはたります。

①かゆみ止め成分が浸透



②尿素が水分をとりこむ



(イメージ図)



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 傷口又は赤く腫れている所
- (3) ただれやひび割れのひどい所



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

## 使用法

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

### 〈使用法に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。
- (4) 使用前によく振って下さい。

## 成分・分量

本剤は、乳液で、100g中に次の成分を含有しています。

尿素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g  
クロタミトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g  
ジフェニヒドラミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1g  
グリチルレチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g

添加物：グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ヘキシル、2-エチルヘキサン酸セチル、オレイン酸デシル、メチルポリシロキサン、パルミチン酸デキストリン、塩化アンモニウム、リン酸二水素K、リン酸水素2Na、*l*-メントール

塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元  
**田村薬品工業株式会社**  
奈良県御所市西寺田50