

マツウラの生薬



日本薬局方

ヨクイニン


薏苡仁



第3類医薬品

500g

製造販売元

 松浦薬業株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

ヨクイニン

日本薬局方

ヨクイニン

COICIS SEMEN

第3類医薬品

ヨクイニンは、ハトムギの名で広く知られています。代表的な民間薬として、古くから肌荒れやイボ取りに常用されています。

⚠ (使用上の注意)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	腹痛
皮膚	発疹

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢
4. 3ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(成分)

日本薬局方 ヨクイニン
ヨクイニンは、ハトムギ *Coix lacrymajobi* L. var. *mayuen* Stapf (イネ科) の種皮を除いた種子です。

(効能・効果)

いぼ、皮膚のあれ

(用法・用量)

大人(15歳以上)は、1日量30gを水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服してください。

○用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児(15歳未満)には服用させないでください。
- (3) 煎じた薬液は、その日の内に服用してください。

(保管及び取扱い上の注意)

- ① 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)なお、開封後は輪ゴムなどでとめ、缶などに入れて保管してください。

(お問い合わせ先)

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口
TEL (052) 883-5172
受付時間10:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

[副作用被害救済制度]

☎ 0120-149-931

Lot



PE,PP



4 987457 319014